

Covid-19 – Schémas vaccinaux recommandés

07/07/2002

	Primovaccination complète	Rappel*	Rappel*
de 5 à 11 ans	Deux doses espacées de trois à sept semaines ou une dose et une infection (Pfizer pédiatrique)	Pas de recommandation	Pas de recommandation sauf immunodépression
de 12 à 29 ans	Deux doses espacées de trois à douze semaines selon le vaccin ou une dose et une infection (Pfizer, Novavax après 18 ans)	Injection ou infection à trois mois de la fin de la primovaccination (Pfizer)	Pas de recommandation sauf immunodépression
de 30 à 54 ans	Deux doses espacées de trois à douze semaines selon le vaccin ou une dose et une infection (Pfizer, Moderna, Novavax)	Injection ou infection à trois mois de la fin de la primovaccination (Pfizer ou Moderna)	Pas de recommandation sauf immunodépression
de 60 à 79 ans	Deux doses espacées de trois à douze semaines selon le vaccin ou une dose et une infection (Pfizer, Moderna, Novavax)	Injection ou infection à trois mois de la fin de la primovaccination (Pfizer ou Moderna)	Injection ou infection à six mois du précédent rappel (injection ou infection) (Pfizer ou Moderna)
80 ans et plus	Deux doses espacées de trois à douze semaines selon le vaccin ou une dose et une infection (Pfizer, Moderna, Novavax)	Injection ou infection à trois mois de la fin de la primovaccination (Pfizer ou Moderna)	Injection ou infection à trois mois du précédent rappel (injection ou infection) (Pfizer ou Moderna)

** si le délai entre la dernière injection et l'infection par le Covid-19 est inférieure au délai indiqué, le rappel est effectué à 3 mois (premier rappel, 80 ans et plus) ou à 6 mois (60 à 79 ans) de l'infection*